



中华医学会妇科肿瘤学分会

# 中国妇科肿瘤临床实践指南

第7版（2023）

## 子宫肉瘤 (Uterine Sarcoma) 讨论稿



# 子宫肉瘤指南专家委员会

主 编：王建六 孔北华

主 审：马 丁 向 阳

副主编：刘开江 曲芃芃 王世宣 郑 虹 宋 坤

编 委（以姓氏笔划为序）：

王颖梅 杨 红 杨 萍 汪希鹏 赵卫东

娄 阁 凌 斌 郭红燕 曹冬焱 薛 敏

秘 书：张 果



# 目录

# 子宫肉瘤

## 一、诊疗路径

- (一) 诊断和初始治疗
- (二) 辅助治疗
- (三) 随访及复发后治疗
- (四) 局部复发后治疗

## 二、诊疗原则

- (一) 病理诊断及分子检测原则
- (二) 影像学评价原则
- (三) 分期原则
- (四) 手术治疗原则
- (五) 全身治疗原则
- (六) 放射治疗原则
- (七) 治疗副反应及处理原则


## 三、讨论

- (一) 概述
- (二) 病理特征
- (三) 评估及分期
- (四) 保留生育功能
- (五) 辅助治疗
- (六) 晚期复发患者治疗



## 子宫肉瘤

## 诊断和初始治疗



1. 尽管子宫肉瘤活检的敏感性低于子宫内膜癌, 术前影像和活检仍有助于诊断  
2. 如可疑恶性间叶细胞肉瘤, 应避免术中碎瘤, 完整切除及取出子宫  
3. 针对育龄期患者, 卵巢切除可个体化处理, 如ER/PR阳性, 应行BSO

BSO: 双侧输卵管卵巢切除术; TH: 全子宫切除术; LMS: 平滑肌肉瘤; ESS: 子宫内膜间质肉瘤; ER: 雌激素受体; PR: 孕激素受体;  
LGESS: 低级别子宫内膜间质肉瘤; HGEES: 高级别子宫内膜间质肉瘤; UUS: 未分化子宫肉瘤; EBRT: 外照射放疗; VBT: 阴道近距离放疗



子宫肉瘤

辅助治疗



1. SO：肉瘤成分过度生长（sarcomatous overgrowth），指单纯肉瘤成分超过整个肿瘤的25%，此时肿瘤为高级别，具有高侵袭性，预后差。

2. 绝经后或既往已行BSO

3. 证据级别2B

4. II期、III期、IVA期证据级别2B，IVB期姑息治疗

5. ER或PR阳性的患者可使用内分泌治疗

EBRT：外照射放疗

PEComa：血管周围上皮样细胞肿瘤



## 子宫肉瘤

## 随访及复发后治疗

### •随访时间

前3年每3~4个月随访，以后每6~12个月随访。

### •临床影像学检查

CT/MRI（胸部/腹部/盆腔）：前3年每3~6个月检查一次；4~5年每6~12个月；之后根据肿瘤细胞类型、分级及初始分期，可考虑每1~2年检查1次，连续5年。

有复发征象者随时复查。

上述检查不能排除肿瘤转移时，宜行全身PET/CT检查。

•**盆腔检查**：双合诊/三合诊。

### •健康宣教

生活方式、肥胖、运动、营养、性健康、戒烟、营养咨询等。

局部复发  
阴道/盆腔  
影像学检查排除远处转移

参照复发后治疗

孤立转移灶

可切除

手术切除/局部消融治疗

- 考虑术后EBRT
- 考虑术后全身治疗

不可切除

全身治疗

如可能，考虑手术

和/或局部治疗  
（如EBRT，射频消融）


播散转移

全身治疗±姑息性放疗  
或对症支持治疗



## 子宫肉瘤

### 局部复发后治疗





**一、病理学评估(包括平滑肌肉瘤、腺肉瘤、子宫内膜间质肉瘤、未分化肉瘤等)：**强烈推荐妇科病理学专家阅片。

（一）子宫：子宫切除术类型、标本完整性（完整、开放、碎瘤术后及其他）、肿瘤大小、肌层浸润（仅针对腺肉瘤）、组织学类型、组织学分级（仅针对腺肉瘤）及淋巴脉管间隙浸润。宫颈浸润切缘

（二）其他组织/器官受累：输卵管、卵巢、阴道、宫旁、腹膜、肠管，大网膜及其他部位。

（三）腹膜/腹水细胞学检查：虽然细胞学本身不影响FIGO分期，但仍应获得细胞学结果，因为细胞学阳性是一个不利的危险因素。

（四）淋巴结（如切除）：淋巴结受累水平（如盆腔、髂总、腹主动脉旁淋巴结）及转移淋巴结数目。

**二、分子检测：**分子检测对恶性间质肿瘤的精准分类具有重要意义。

使用经过验证和/或获批的检测方法进行全面的基因组分析有助于预测罕见的泛肿瘤治疗靶点，检测项目至少应包括*NTRK*、*MSI*和*TMB*等。

分子检测手段包括：1、融合基因的RNA靶向测序；2、二代测序特异性靶基因突变检测；3、用于基因重排的荧光原位杂交





子宫肉瘤

病理诊断和分子检测原则

肿瘤	组织学特征	分子特征	免疫组化特征	预后特征
子宫平滑肌肉瘤（uLMS）	<p>梭形细胞型（普通型）： 最为常见，伴有两种或两种以上特征:1.中度至重度细胞异型性，2.肿瘤凝固性坏死，3.核分裂象<math>\geq 4</math>个/mm<sup>2</sup>（相当于有丝分裂指数(MI)<math>\geq 10/10</math> HPFs）。</p> <p>上皮型uLMS表现出典型的上皮样形态（&gt;50%），主要由圆形或多角形细胞构成，具有中-重度核异型，核分裂象<math>\geq 1.6</math>个/mm<sup>2</sup>(MI<math>\geq 4</math>个/10 HPFs)。</p> <p>黏液型uLMS最为少见，具有丰富的黏液间质，细胞稀疏，具有中-重度核异型，核分裂象<math>\geq 0.4</math>个/mm<sup>2</sup>(MI<math>\geq 2</math>个/10 HPFs)。</p>	<p>普通型uLMS复杂的核型异常（数量和结构异常）典型特征，常见的染色体缺失包括10q (PTEN)、12q、2p和16q等，染色体扩增较少，主要见于17p。最常见的突变基因包括 <i>TP53</i>（~60%），<i>RB1</i>（~50%），<i>ATRX</i>（~30%），<i>MED12</i>(~20%)。</p> <p>上皮型uLMS部分存在<i>PGR</i>融合，检测致病性<i>TSC1/2</i>突变或<i>TFE3</i>、<i>RAD51B</i>等融合基因改变鉴别PEComa。</p> <p>约25%黏液型uLMS存在<i>PLAG1</i>融合。鉴别诊断包括炎性肌成纤维细胞瘤、粘液样子宫内质瘤和良性粘液样平滑肌瘤。</p>	<p>表达平滑肌标记物，如 desmin, h-caldesmon, SMA 和 HDCA8。</p> <p>大多数普通型uLMS具有 p16 和 p53 的弥漫表达。约30%~40%的LMS 表达ER 多数PR表达缺失。</p> <p>表达特征是多样的，有一个或多个标志物可能表达缺失。</p>	<p>高度恶性肿瘤，分期是预后最好的预测指标。</p> <p>组织形态学尚未显示出预测价值。</p> <p>有限数据表明PR高表达可能与早期LMS较好预后相关。</p>



子宫肉瘤

病理诊断和分子检测原则

肿瘤	组织学特征	分子特征	免疫组化特征	预后特征
低级别子宫内膜间质肉瘤 (LGESS)	细胞学较温和的梭形细胞肿瘤，细胞类似于增殖期子宫内膜间质，具有均匀的椭圆或梭形细胞核，通常细胞质稀少，没有或轻度核异型性。核分裂数相不是诊断标准，通常较低。均匀分布的小动脉，有明显的指样肌层侵蚀伴或不伴LVSI。	超过2/3存在融合基因改变， <i>JAZF1-SUZ12</i> 融合最常见(>50%)。其次是 <i>JAZF1-PHF1</i> ， <i>EPC1-PHF1</i> 和 <i>MEAF6-PHF1</i> 等。	弥漫性强表达CD10，IFITM1，ER和PR。  典型地平滑肌分化时，desmin和h-caldesmon表达阳性。	分期是最重要的预后因素。  相对温和的肉瘤，即使在复发患者中也具有较长的生存期。
高级别子宫内膜间质肉瘤 (HGESS)	<p>具有均匀的高级别圆形和/或梭形形态，有时具有低级别成分。肿瘤呈现扩张性、渗透性或浸润性生长等多种侵袭模式，典型表现为舌样侵蚀，淋巴脉管浸润，有丝分裂活跃，肿瘤凝固性坏死。YWHAE-NUTM2阳性肿瘤具有嗜酸性粒细胞质和高级别细胞核的圆形细胞成分，并具有精细的分支血管，核分裂相<math>\geq 1.6</math>个/mm<sup>2</sup>（MI<math>\geq 4/10</math> HPFs）。</p> <p>ZC3H7B-BCOR阳性肿瘤和BCOR内部串联重复(internal tandem duplication ,ITD)肿瘤特征是高级别梭形细胞嵌在黏液样基质中。</p> <p>ZC3H7B-BCOR阳性肿瘤和BCOR内部串联重复(internal tandem duplication ,ITD)肿瘤特征是高级别梭形细胞嵌在黏液样基质中。</p>	<p>YWHAE-NUTM2融合，</p> <p>ZC3H7B-BCOR融合，</p> <p>BCOR内部串联重复（BCOR-ITD）。</p>	<p>建议采用CD10、ER、PR、cyclin D1、BCOR等免疫组化指标协助诊断。</p> <p>Cyclin D1在所有亚型中均呈弥漫性强表达。</p> <p>YWHAE-NUTM2融合阳性肿瘤BCOR，KIT，CD56和CD99呈阳性，ER，PR，CD10和DOG1呈阴性。</p> <p>ZC3H7B-BCOR阳性肿瘤通常弥漫性CD10阳性，只有约50%的病例表达BCOR，伴有可变的ER和PR表达。</p> <p>BCOR-ITD肿瘤BCOR呈弥漫性阳性，CD10的阳性率较低，ER和PR呈阴性。</p>	与LG-ESS相比，更具侵袭性，淋巴结转移率略高，预后较差。



肿瘤	组织学特征	分子特征	免疫组化特征	预后特征
未分化子宫肉瘤(UUS)	通常表现出破坏性的肌层浸润模式，多形性上皮样细胞和/或梭形细胞浸润，具有活跃的有丝分裂活性。	缺乏特异性分化证据，没有明确的分子特征	<p>一种排除性诊断。</p> <p>免疫组化检测多为阴性： CD10，cyclin D1，desmin， SMA，h-caldesmon，pan-CK， EMA，BRG1，INI1，pan-Trk， ALK，HMB45，melanA， SOX10，S100，CD34和STAT6 可协助鉴别。</p>	<p>与预后不良有关。</p> <p>ER和/或PR表达可能与生存率的提高有关。</p> <p>MI ≥ 11个/ mm<sup>2</sup>及细胞外基质表达与生存率降低相关</p>



子宫肉瘤

病理诊断和分子检测原则

肿瘤	组织学特征	分子特征	免疫组化特征	预后特征
血管周围上皮样细胞肿瘤 (PEComa)	<p>由表达黑色素细胞和平滑肌标记物的血管周围上皮细胞(PEC)组成的间充质肿瘤。在薄壁血管间隙和硬化间质背景下，肿瘤细胞围绕薄壁血管呈片状或巢状排列，表现出不同的细胞异型性、有丝分裂活动和黑色素色素表达。目前的算法将肿瘤分为良性、恶性潜能未定型和恶性，如下所述。</p> <p>1. 良性：&lt;5 cm，无膨胀性生长，无血管侵犯，无高级别核，有丝分裂相≤1 /50 mm<sup>2</sup>。</p> <p>2. 恶性潜能未定型：一般标准：&gt;5cm 或存在畸形核/多核巨细胞。</p> <p>改良妇科特异性标准:&lt;3项标准(≥5 cm, 高级别核，有丝分裂相&gt;1 /50 mm<sup>2</sup>, 坏死，血管侵犯)。</p> <p>3. 恶性:根据一般标准，至少有以下2个特征，根据改良妇科特异性标准，至少有3个特征(&gt;5cm, 膨胀性生长，高级别核，有丝分裂相&gt;1/50 mm<sup>2</sup>, 坏死和血管侵犯)。</p>	<p>TSC1/TSC2突变失活导致mTOR通路上调， 可见TFE3、RAD51B或HTR4-ST3GAL1基因融合。</p> <p>TSC突变和TFE3融合是互斥的。</p> <p>原位杂交证实TFE3易位相关肿瘤存在TFE3重排或融合</p>	<p>组织蛋白酶K基本上在所有肿瘤中均为阳性。</p> <p>PEComas表达黑素细胞标记物HMB45 和 Melan-A， 其中HMB45是最敏感的，在几乎所有的肿瘤中呈阳性，而melan-A是更特异的，在至少一半的肿瘤中呈阳性。至少表达一种平滑肌标记物 (SMA、Desmin 和 h-caldesmon)。</p> <p>TFE3 易位 相关 肿瘤 TFE3、HMB45弥漫性表达，Melan-A局灶表达或缺失。</p> <p>平滑肌标志物表达变化多样，但通常为弱至阴性。</p>	<p>使用三种算法来分层恶性潜能.由于mTOR信号通路的激活，可以考虑mTOR抑制剂。</p> <p>有限的证据表明RAD51B融合的肿瘤可能更具侵袭性。</p>



子宫肉瘤

病理诊断和分子检测原则

肿瘤	组织学特征	分子特征	免疫组化特征	预后特征
炎性肌纤维母细胞瘤（IMT）	<p>由肌纤维母细胞和纤维母细胞组成的间质肿瘤，伴有炎性浸润（通常是淋巴浆细胞）。主要有三种组织学模式：</p> <p>1.散在黏液型，以在丰富的黏液样基质中细胞分散为特征，形成筋膜炎样或组织培养样外观。</p> <p>2.束状/层状型，特征为细胞排列在呈叉束状或较不常见的层状结构。</p> <p>3.透明型，特点是透明化密集的胶原基质，肿瘤细胞不明显。</p>	<p>ALK重排见于大约75%病例，常见的融合基因包括 <i>IGFBP5</i>、<i>THBS1</i> 和 <i>TIMP3</i>。</p> <p><i>RANBP2-ALK</i>和<i>RRBP1-ALK</i>融合见于具有上皮样形态的侵袭性IMT。</p>	<p>ALK颗粒状胞质阳性具有高度的特异性和敏感性，见于大约95%的病例。</p> <p>ALK阴性子宫IMT很少见。</p> <p>肌细胞标记物（Desmin，SMA和/或h-caldesmon）阳性很常见。</p> <p>CD10通常为阳性。</p> <p>keratin，S100,CD34 和 CD117为阴性。</p> <p>p53是野生型。</p>	<p>通常是良性且局限于子宫，可发生复发和宫外播散。</p> <p>与腹膜IMT一样，大于7cm且伴有坏死、淋巴脉管浸润、重度细胞异型和高MI的肿瘤具有侵袭性。</p> <p>具有ALK重排特征肿瘤可能对酪氨酸激酶抑制剂有反应。</p>
SMARCA4缺陷型子宫肉瘤 (SDUS)	<p>SDUS的特征是与透明基质相关的上皮样/横纹肌样细胞片，局灶可见小细胞成分或梭形细胞形态。</p> <p>LVSI、高MI和坏死常见。</p>	<p>双等位基因 <i>SMARCA4</i>突变失活应考虑进行胚系 <i>SMARCA4</i>突变检测。</p>	<p>CK及BRG1(<i>SMARCA4</i>)表达缺失</p>	



子宫肉瘤

病理诊断和分子检测原则

肿瘤	组织学特征	分子特征	免疫组化特征	预后特征
NTRK重排肉瘤	多见于子宫颈，梭形细胞束状、鱼骨状或无序状增生，可见嵌入的腺体，有时有类似腺肉瘤的息肉样突起，然而通常没有腺体周围间质凝集。	<i>NTRK1/2/3</i> 融合，融合基因包括： <i>TPR, TPM3, EML4, TFG, SPECC1L, C16orf72</i> 和 <i>IRF2BP2</i>	CD34和/或S100通常都阳性，但程度不同。 泛TRK通常为阳性，但该标记物对基因融合不特异性。	通常表现为I期，约1/3复发或转移。针对酪氨酸激酶受体的靶向治疗已显示出临床效益。
类似卵巢性索肿瘤的子宫肿瘤 (UTROSCT)	轻度梭形细胞增殖，广泛性索样分化，无子宫内膜间质成分。	在大多数肿瘤中存在 <i>ESR1</i> 或 <i>GREB1</i> 融合。 该肿瘤不具有低级别子宫内膜间质肉瘤( <i>JAZF1-SUZ12</i> 融合)、成人颗粒细胞瘤( <i>FOXL2</i> 突变)或支持-莱迪格细胞瘤( <i>DICER1</i> 突变)中所见的分子改变。	肿瘤具有多表型免疫组化特征，显示多向分化，除性索标记物 (inhibin, calretinin, SF1, FOXL2, Melan-A)外，不同程度的表达上皮标记物、ER、PR、平滑肌标记物(actin、desmin和h-caldesmon)和CD10。	肿瘤恶性潜能不确定，约25%为恶性，少数良性病例有复发或转移，因此也被认为有低度恶性风险。 坏死和MI≥2/10 HPFs和/或存在 GREB1 融合可增加恶性行为的可能性。



子宫肉瘤

病理诊断和分子检测原则

肿瘤	组织学特征	分子特征	免疫组化特征	预后特征
横纹肌肉瘤(RMS)	<p>分为3个亚型：</p> <p>胚胎性横纹肌肉瘤 (embryonic rhabdomyosarcoma, ERMS) 由小的原始间质细胞组成，可形成类似葡萄簇样肿瘤的“形成层”，可见带状细胞和胎儿软骨。</p> <p>腺泡性横纹肌肉瘤 (alveolar rhabdomyosarcoma, ARMS )小的原始间质细胞呈巢状排列，中间被纤维血管隔开，中心常有细胞聚力消失，形成不规则的腺泡间隙和不同程度的囊性改变。</p> <p>多形性横纹肌肉瘤 (pleomorphic rhabdomyosarcoma, PRMS)由非典型、多核、梭形或横纹肌状细胞片组成，细胞浆嗜酸性。</p>	<p>ERMS来自DICER1综合征，95%存在<i>DICER1</i>突变。</p> <p>大于95%的ARMS中存在t(2;13)(q36;q14)易位导致的<i>PAX3-FOXO1</i>和<i>PAX7-FOXO1</i>基因融合。</p> <p>PRMS具有复杂的染色体数量和不平衡结构的改变，但没有特异性特征。多数病例发生<i>PIK3CA</i>和<i>TP53</i>突变。</p>	<p>肌球蛋白和/或MyoD1的IHC表达证实了横纹肌肉瘤的分化。</p> <p>ERMS必须广泛取样以排除癌肉瘤或伴肉瘤性过度生长的腺肉瘤。几乎全阳性表达desmin，MYF4和MYOD1。MSA和SMA也通常为阳性。</p> <p>ARMS阳性表达desmin、myogenin和MYOD1。myogenin的核表达强烈且弥漫性。</p> <p>PRMS通常desmin强阳性，MYOD1和myogenin的表达局限。</p>	<p>胚胎型比多形性和腺泡型预后好。年龄和分期是预后因素。</p> <p>ARMS融合阳性患者比融合阴性预后差，PAX3-FOXO1阳性预后低于PAX7-FOXO1阳性患者。</p> <p>PRMS是高度侵袭性肉瘤，死亡率达80%，肺转移常见。</p>





子宫肉瘤

病理诊断和分子检测原则

肿瘤	组织学特征	分子特征	免疫组化特征	预后特征
苗勒管腺肉瘤 (MAS)	<p>双相肿瘤，由良性肿瘤性腺体成分和肉瘤性间质成分构成的混合性肿瘤，恶性间质成分通常是低级别的，由梭形和/或圆形细胞组成，前者常排列成漩涡状，而后者排列松散，间质细胞在腺体周围聚集，远离腺体处间质细胞较稀疏，呈套袖样，形成所谓生发层。</p> <p>肉瘤性过度生长是指腺肉瘤中的纯肉瘤成分占肿瘤体积的25%以上。</p> <p>高级别腺肉瘤具有显着的核异型性和多形性</p>	<p>缺乏特异性的基因突变或染色体变异等特征。</p> <p>部分可见8q13扩增和<i>MYBL1</i>拷贝数增多，与肉瘤性过度生长相关。</p> <p>小部分可见<i>NCOA2/3</i>基因融合。</p>	<p>无肉瘤性过度生长时，间质成分免疫组化类似于子宫内膜间质肉瘤。</p> <p>有肉瘤性过度生长时，间质成分类似于高级别子宫肉瘤，有较高的 Ki-67 指数，p53 阳性，ER、PR 和 CD10 通常阴性。</p>	<p>腺肉瘤预后相对较好， 但仍有25%的患者死亡。 约5%的病例出现局部复发和远处转移。</p> <p>高级别、肌浸润和肉瘤性过度生长是不良预后因素。</p> <p>高级别核异形性也可能预示预后较差。</p>





### 一、影像学检查推荐

- （一）初始治疗推荐行胸部/腹部/盆腔CT检查。
- （二）对于全子宫切除术后意外发现的子宫肉瘤或子宫/附件不完全切除术（如筋膜内全子宫切除术、肌瘤剔除术、可能的肿瘤破裂、腹腔内碎瘤术）后，应行胸部/腹部/盆腔CT或腹部/盆腔MRI及胸部CT平扫以了解有无转移病变。除非有禁忌证，均推荐增强MRI和CT（肺CT除外）。
- （三）对于不全手术后或子宫/附件未切除者，建议行盆腔MRI检查以明确肿瘤局部扩散范围或有无残留病变。检查结果不明确者可行颈部/胸部/腹部/盆腔/腹股沟PET-CT检查。
- （四）肿瘤复发的患者，需根据症状、体征和检查情况额外增加其他影像学检查。

### 二、影像学特点

- （一）妇科彩色多普勒超声 目前在我国仍然是最常用的影像学检查方法。
  - 1、子宫平滑肌肉瘤：超声诊断平滑肌肉瘤有难度和局限性，但对于子宫肌层内单发病灶，呈稍高回声或不均质回声，且边界不清，内部回声不均匀，血供丰富，病灶质地柔软，探头加压变形时可能为恶性病变，待病理诊断确诊。
  - 2、子宫内膜间质肉瘤：超声检查可表现为来源于子宫内膜的边界不规则的低回声团块，呈实性或囊实性，最常见的表现为实性肿块伴囊变和坏死，呈“卵石征”改变。但是，这些特征也可见于良性的子宫肌瘤，因此，盆腔超声检查的鉴别诊断意义有限。
- （二）MRI 在子宫肉瘤诊断中，相比盆腔超声成像，MRI可提供更多的分析细节。
  - 1、子宫平滑肌肉瘤：瘤体较大，形态不规则，边界不清晰，侵袭性生长，瘤内极不均质，瘤内局灶的（而广泛的、大片的T1高信号区域更倾向于肌瘤的红色变性或脂肪变性）短T1信号（提示出血）高度提示其诊断。
  - 2、子宫内膜间质肉瘤：位于宫腔内，特点为伴不同程度子宫肌层浸润，呈结节状、舌状、蠕虫状广泛地浸润子宫肌层，与肌层T2信号相似，与肌层分解不清，当呈蚯蚓状沿血管、淋巴管和阔韧带向子宫外蔓延生长时与子宫平滑肌瘤病变相仿。与肌层的交界面有时可见T2低信号索条，代表残余的子宫肌束。瘤体内部可见供血血管影，但无腺上皮特征性的多发微小囊泡。
  - 3、腺肉瘤：肿瘤形态呈肿块型，边界清晰锐利，瘤内不均质，瘤内多见多发微小囊泡影，瘤内血供丰富，甚至可见流空血管影，肿瘤的强化程度随肿瘤直径的增大而增大。DWI信号较高，ADC值较低。



子宫肉瘤

分期原则

子宫平滑肌肉瘤/子宫内膜间质肉瘤分期[AJCC分期（2017年，第8版）及FIGO（2009年）分期]

AJCC分期			FIGO分期			
T	N	M		原发肿瘤	区域淋巴结	远处转移
Tx				无法评估原发肿瘤		
T0				无原发肿瘤证据		
	Nx				无法评估区域淋巴结	
	N0				无区域淋巴结转移	
	N0 (i+)				区域淋巴结中孤立肿瘤细胞团不大于0.2mm	
		M0				无远处转移
T1			I	肿瘤局限于子宫		
T1a			IA	肿瘤最大直径 ≤ 5cm		
T1b			IB	肿瘤最大直径 > 5cm		
T2			II	肿瘤超出子宫，局限在盆腔内		
T2a			IIA	肿瘤累及附件		
T2b			IIB	肿瘤累及其他盆腔组织		
T3			III	肿瘤浸润腹腔组织		
T3a			IIIA	单个部位		
T3b			IIIB	多于1个部位		
	N1		IIIC		盆腔或腹主动脉旁淋巴结转移	
			IVA	膀胱和（或）直肠转移		
		M1	IVB			远处转移（不包括附件、盆腔和腹部组织）



子宫肉瘤

分期原则

子宫腺肉瘤分期[AJCC分期（2017年，第8版）及FIGO（2015年）分期]

AJCC分期			FIGO分期			
T	N	M		原发肿瘤	区域淋巴结	远处转移
Tx				无法评估原发肿瘤		
T0				无原发肿瘤证据		
	Nx				无法评估区域淋巴结	
	N0				无区域淋巴结转移	
	N0 (i+)				区域淋巴结中孤立肿瘤 细胞团不大于0.2mm	
		M0				无远处转移
T1			I	肿瘤局限于子宫		
T1a			IA	肿瘤局限在内膜或宫颈管，无肌层浸润		
T1b			IB	肿瘤侵犯 ≤ 1/2肌层		
T1c			IC	肿瘤侵犯 > 1/2肌层		
T2			II	肿瘤超出子宫，局限在盆腔内		
T2a			IIA	肿瘤累及附件		
T2b			IIB	肿瘤累及其他盆腔组织		
T3			III	肿瘤浸润腹腔组织		
T3a			IIIA	单个部位		
T3b			IIIB	多于1个部位		
	N1		IIIC		盆腔或腹主动脉旁淋巴结转移	
			IVA	膀胱和（或）直肠转移		



子宫肉瘤的标准术式是全子宫切除术及双附件切除术（Bilateral Salpingo-oophorectomy, BS0），一般不常规施行系统性盆腔及腹主动脉旁淋巴结切除术，但术中应予探查，肿大或可疑转移的淋巴结应予切除。子宫外有病灶者，需同时行转移病灶切除。子宫肉瘤的手术强调完整切除及取出子宫，切忌在腹腔内施行肿瘤或子宫分碎术，因此通常选择经腹手术途径。

对于年轻的绝经前患者，推荐对肿瘤组织标本进行ER/PR检测来指导卵巢处理，一般来说，LGESS或表达ER/PR的肿瘤首选行BS0。LGESS患者保留卵巢复发率极高，故建议双侧附件切除，也不提倡术后雌激素替代治疗。对于年轻的、ER阴性的早期uLMS患者，如有保留激素功能的需求，在进行充分评估告知风险后可选择保留卵巢。

对于子宫良性疾病手术后病理学检查确诊为子宫肉瘤者，多数需再次手术。术前应尽可能明确病理学类型，同时行影像学检查（增强CT或MRI）明确有无盆腔外转移病灶。再次手术通常需切除残留的子宫、宫颈或附件，术中探查到的肿大淋巴结或可疑转移淋巴结或子宫外转移病灶应切除干净。对于前次手术行子宫或肌瘤分碎术的患者，应再次手术探查，尽可能彻底清理散落病灶。

对有生育要求的子宫肉瘤患者实施保留生育功能手术应格外谨慎。目前没有高级别证据支持子宫肉瘤患者实施保留生育功能手术的安全性，仅见于一些个案报道。一般来说，恶性程度高的子宫肉瘤如uLMS、HGESS及UUS等，均不主张实施保留子宫的手术；仅在少数恶性程度低，如早期的LGESS、腺肉瘤或横纹肌肉瘤患者中有相关报道，对于I期、年轻、有强烈生育需求患者，在充分评估生育能力、不伴有子宫外转移病灶，且患者明确知情同意、愿意承担风险的前提下，可谨慎进行保留生育手术，强调术后需严密随访，推荐完成生育后尽早行标准手术治疗。



## 一、化疗

### （一）适用范围：

- 1、高级别ESS、UUS和uLMS：①I期术后观察；②II期和III期若肿瘤完全切除且切缘为阴性可观察，若切缘阳性选择用或不用化疗和/或放疗；③IVA期术后应化疗和/或放疗；④IVB期应化疗和/或姑息性放疗。
- 2、腺肉瘤伴肉瘤过度生长：①I期术后可观察；②II-IV期术后化疗和/或放疗。

### （二）推荐用药：

- 1、单药：多柔比星（推荐首选）在的子宫肉瘤患者中客观反应率为22%，中位无进展间隔为3.2个月，中位生存期为6.7个月（2A类）；其他单药方案有：表柔比星单药化疗反应率为18%，异环磷酰胺在成人软组织肉瘤中缓解率为18%，与环磷酰胺比较有更好的反应率并且副作用也更少；帕唑帕尼在子宫平滑肌肉瘤中部分缓解率达11%，PFS达3个月，OS达17.5个月；替莫唑胺在软组织肉瘤中的缓解率可达10.5%；达卡巴嗪与艾日布林相比在平滑肌肉瘤（包含28%~30%ULMS）PFS和OS（12.7个月和13.0个月），两个治疗组的中位PFS相似（2.6个月），其中艾日布林12周无进展率为32%；曲贝替定在平滑肌肉瘤中部分缓解率16%；吉西他滨作为子宫平滑肌肉瘤二线治疗的单药化疗的客观反应率为20.5%（2A类）。
- 2、联合用药：多西他赛/吉西他滨（联合用药推荐）可作为首选治疗方案，在子宫平滑肌肉瘤患者中客观反应率为27%，但毒性作用强于吉西他滨单药治疗（2A）；多柔比星联合异环磷酰胺客观反应率为26%；吉西他滨/达卡巴嗪3个月缓解率可达56%，其他的联合用药方案有多柔比星/达卡巴嗪、吉西他滨/达卡巴嗪、吉西他滨/长春瑞滨（2B类）。



## 二、内分泌治疗

### （一）适用范围：

- 1、腺肉瘤不伴肉瘤过度生长和低级别ESS：①I期术后观察或雌激素阻断；②II-IVA期术后使用抗雌激素治疗和/或放疗；③IVB期术后使用抗雌激素治疗和/或姑息性放疗
- 2、ER/PR检测阳性的uLMS和UUS的患者术后可选用抗雌激素治疗

### （二）推荐用药：

芳香化酶抑制剂（首选），在子宫内膜间质肉瘤中的3个月缓解率达73%，一项在 ER 和/或 PR 阳性子宫LMS 患者中使用来曲唑的小型前瞻性研究表明，12周无进展生存率为50%；ER/PR阳性的LGESS对孕激素的反应时间可达18-180个月；二线药物还可选择促性腺激素释放激素[GnRH]类似物，控制率达72.7%；另外还可以使用醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮（2B 类）。

## 三、免疫和靶向治疗

经病理确诊的血管周上皮样瘤（PEComa）使用西罗莫司反应率可达39%（2A）；具有ALK重排的炎性肌纤维母细胞瘤（IMT）可选择使用酪氨酸激酶抑制剂，总体反应率86%（2A）；帕博利珠单抗可用于TMB-H的肉瘤患者，其缓解率可达29%（2A）；拉罗替尼或恩曲替尼用于基因测序确定的NTRK基因融合阳性的实体肿瘤患者，其中拉罗替尼有效率75%，恩曲替尼有效率57%（2B）；包含BRCA2-突变的uLMS患者在使用PARP抑制剂治疗可得到较好的持续缓解（2A类）。





子宫肉瘤

全身治疗原则

	首选方案	其他推荐方案	特定情况用药
全身治疗	<ul style="list-style-type: none"><li>• 多柔比星</li><li>• 多西他赛/吉西他滨</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 多柔比星/异环磷酰胺</li><li>• 多柔比星/达卡巴嗪</li><li>• 吉西他滨/达卡巴嗪</li><li>• 吉西他滨/长春瑞滨</li><li>• 达卡巴嗪</li><li>• 吉西他滨</li><li>• 表柔比星</li><li>• 异环磷酰胺</li><li>• 脂质体多柔比星</li><li>• 帕唑帕尼</li><li>• 替莫唑胺</li><li>• 艾立布林（2B类）</li></ul>	N/A
内分泌治疗	芳香化酶抑制剂	<ul style="list-style-type: none"><li>• 醋酸甲地孕酮</li><li>• 醋酸甲羟孕酮</li><li>• 促性腺激素释放激素 [GnRH] 类似物（2B 类）</li></ul>	
免疫和靶向治疗	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"><li>• 帕博利珠单抗用于TMB-H肿瘤</li><li>• 拉罗替尼或恩曲替尼用于NTRK基因融合阳性肿瘤（2B类）</li><li>• 考虑PARP抑制剂治疗BRCA2-改变的uLMS<ul style="list-style-type: none"><li>➢ 奥拉帕利</li><li>➢ 尼拉帕利</li></ul></li><li>• mTOR抑制剂可用于血管周上皮样瘤（PEComa）</li><li>• 酪氨酸激酶抑制剂可用于ALK重排的炎性肌纤维母细胞瘤（IMT）和NTRK重排肉瘤</li></ul>



### 一、放疗适应证

放射治疗不作为子宫肉瘤治疗的首选，主要用于FIGO分期II期及以上有肿瘤残留或有亚临床转移患者的补充治疗，以及复发、转移病灶的姑息性治疗，需要成像来评估局部范围。放疗还可用于术前病灶较大的患者，用以提高手术的切除率。除此之外，对于经活检或子宫肌瘤核除术后确诊，并且不能耐受手术者，放疗可联合全身治疗改善患者预后。

### 二、放疗的范围

包括外照射放疗EBRT和阴道近距离放疗VBT。外照射放疗主要用于播散和转移病灶的治疗，照射范围除了盆腔淋巴结引流区外，扩大照射范围应包括髂总动脉旁淋巴引流区和腹主动脉旁淋巴引流区，扩展野的上边界视临床情况而定，但至少应在肾血管水平以上1~2cm处。亚临床病灶一般给予45~50Gy；明确的病灶，至少需给予60Gy；对于部分较大病灶，可采用精准放疗技术（如调强放疗、立体定向放疗），总剂量达到70Gy以上，应注意保护危及器官。

阴道近距离放疗多用于子宫切除术后阴道局部的放疗、阴道复发病灶的放疗。此时参照点可设于放射源外1cm处，I剂量为1~2周10~20Gy。腔内照射极少情况用于子宫切除前的新辅助放疗。新辅助放疗有助于降低术后切缘不足或切缘阳性的风险。

### 三、外照射放疗

#### （一）术前放疗

术前放疗的主要目的是控制缩小癌灶创造手术机会或缩小肿瘤范围，提高手术切除率。对于不适宜手术且不适合腔内照射者（如子宫>10~12周，或有宫腔外播散者），盆腔外照射剂量45~50Gy，5周完成，6~8周后再次评估是否手术切除。

#### （二）术后放疗与复发转移灶放疗

术后放疗宜采用三维适形放疗或调强放疗，术后外照射总剂量45~50Gy，5~6周完成，可结合2~3次高剂量率腔内照射使总剂量达到75~80Gy，一般剂量为4~6Gy×2~3次。盆腔外照射放疗的靶区应包括肿瘤术后残余病灶/复发病灶、盆腔淋巴结引流区（髂总、髂外、髂内、闭孔淋巴结区）、子宫旁、阴道上段（包含阴道旁组织）和骶前淋巴结区。腹主动脉区延伸野应包括整个腹主动脉旁淋巴引流区域，其上界取决于肿瘤累及的范围，至少应达左肾血管水平并位于肿瘤上2~3cm。





### 四、阴道近距离放疗

#### （一）术前放疗

阴道近距离放疗完成后8~10周评估能否手术；部分腔内术前放疗：A点及F点总剂量不低于20Gy，分2~3次完成，每周1次，放疗后10~14天切除子宫及双侧附件。

#### （二）术后放疗

近距离放疗作为术后辅助治疗可在阴道切口痊愈后开始实施，一般应于术后6~8周开始，不应晚于术后12周。术后阴道近距离放疗范围为阴道上段。照射剂量参考点一般选阴道黏膜面或黏膜下0.5cm，阴道黏膜面给予6Gy×5次，或阴道黏膜下0.5cm处给予7Gy×3次或5.5Gy×4次。对于术后阴道切缘阳性或安全边界不足的情况，应采用外照射放疗联合近距离放疗的方式，如前所述。若术前行体外放疗，应减少术后照射剂量。

### 五、手术无法切除的肿瘤

对手术无法切除的肿瘤应根据部位采用外照和（或）阴道近距离放疗。如果条件允许，宜采用图像引导的放射治疗（特别是图像引导下的近距离放疗）。不能手术患者，如果单独使用近距离放疗，子宫体、子宫颈、阴道上段1~2cm的90%体积至少照射48Gy（等效剂量EQD2）。如果阴道近距离放疗联合外照射，剂量必须增加至65Gy（等效剂量EQD2）。如果采用MRI做近距离放疗计划，可见肿瘤区（gross tumor volume, GTV）的D90剂量应大于或等于80Gy（等效剂量EQD2）。



## 一、化疗的副反应及处理

### （一）子宫肉瘤化疗所致恶心呕吐的预防和治疗

化疗是子宫肉瘤治疗的基石之一，占据不可替代的地位。但化疗所致的恶心呕吐是最常见且最令患者畏惧的不良反应。据统计，如果在化疗过程中没有接受预防呕吐的治疗，70%-80%的患者会出现恶心呕吐，可导致厌食、营养不良、代谢紊乱、脱水、自理能力下降等不良后果，显著降低患者的生活质量及后续抗肿瘤治疗的依从性，严重时影响化疗的剂量和疗程，甚至导致患者不得不终止治疗。

因此，化疗止吐的防治十分重要，应根据化疗药物的不同致吐风险分级进行不同程度的化疗止吐预防和治疗，确保化疗的顺利实施。

子宫肉瘤常用药物的致吐风险及单日化疗的止吐防治推荐见表1。

如果接受多日化疗方案，应给予和每天化疗药物的致吐风险相匹配的止吐药物至化疗结束后2~3天；当两种或以上化疗药物联合使用时，致吐风险等级由联合方案中风险最高的药物决定。



子宫肉瘤

治疗副反应及处理原则

表1 子宫肉瘤系统治疗所致恶心呕吐的风险级别及防治

致吐风险级别	药物	止吐防治推荐
轻微 (呕吐发生率<10%)	靶向药物 长春瑞滨	不推荐常规预防
低度 (呕吐发生率10%-30%)	吉西他滨 多西他赛 艾立布林 多柔比星（脂质体）	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5-HT3受体拮抗剂</li><li>• 地塞米松</li><li>• 氯丙嗪</li><li>• 甲氧氯普胺</li></ul>
中度 (呕吐发生率30%-90%)	替莫唑胺 依达柔比星 阿柔比星 吡柔比星 表柔比星≤90mg/m <sup>2</sup> 多柔比星<60mg/m <sup>2</sup> 环磷酰胺≤1500 mg/m <sup>2</sup> 异环磷酰胺<2g/m <sup>2</sup> （每剂）	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5-HT3受体拮抗剂+地塞米松<sup>a</sup></li><li>• NK-1受体拮抗剂+ 5-HT3受体拮抗剂+地塞米松<sup>b</sup></li><li>• 帕洛诺司琼+地塞米松+奥氮平<sup>c</sup></li></ul>
高度 (呕吐发生率>90%)	氮烯咪胺 表柔比星>90mg/m <sup>2</sup> 多柔比星≥60mg/m <sup>2</sup> 环磷酰胺>1500 mg/m <sup>2</sup> 异环磷酰胺≥2g/m <sup>2</sup> （每剂） AC方案（含蒽环类、环磷酰胺的联合方案）	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5-HT3受体拮抗剂+地塞米松+NK-1受体拮抗剂</li><li>• 奥氮平+地塞米松+帕洛诺司琼</li><li>• 奥氮平+ NK-1受体拮抗剂+地塞米松+ 5-HT3受体拮抗剂</li></ul>

中度致吐风险的治疗推荐：先选a方案，b 、c 方案适合呕吐高危患者或者接受a方案仍有恶心呕吐的患者  
止吐防治推荐证据级别：轻微及低度 2A类，中度及高度 1类



### （二）子宫肉瘤化疗所致骨髓抑制的预防和治疗

化疗引起的骨髓抑制是常见副反应，与化疗药物类型及剂量相关，通常对粒细胞的影响最大，其次是血小板，而红细胞由于半衰期长，影响有滞后性。骨髓抑制可能会导致化疗被迫延迟、减量或更换药物方案，影响肿瘤的治疗效果及预后，甚至导致严重感染、大出血等危及患者生命。

#### 1、子宫肉瘤化疗所致中性粒细胞减少症的防治

子宫肉瘤常用化疗药物多柔比星是细胞周期非特异性药物，吉西他滨是细胞周期特异性药物，两者都有引起中性粒细胞减少症的风险。多西他赛联合吉西他滨的化疗方案有中度致中性粒细胞减少性发热（febrile neutropenia, FN）的风险，FN导致肿瘤患者感染和死亡的风险增加。

根据化疗初治患者的FN发生风险，将化疗方案分为3类，建议结合FN的发生风险及患者的个体差异，实施分层管理（表2）。接受FN高风险的化疗方案，推荐预防性使用粒细胞集落刺激因子（G-CSF）促进造血干细胞增殖、增加粒细胞生成与成熟。接受FN低风险的患者，不建议预防性使用G-CSF。而FN中风险的患者，要结合自身风险因素（包括：年龄>65岁且接受足剂量化疗、既往化疗或放疗、持续性中性粒细胞减少、肿瘤累及骨髓、近期外科手术和/或开放性创伤、肝功能不全（胆红素>2.0mg/dL）、肾功能不全（肌酐清除率<50ml/min）、既往发生过FN、恶性血液淋巴系统疾病、慢性免疫抑制如HIV、营养/体能状况差），个体化预防。

子宫肉瘤全身治疗过程中，如果出现严重的中性粒细胞缺乏（中性粒细胞计数 $<0.1 \times 10^9/L$ ）或预计中性粒细胞缺乏持续>7天，可以使用抗生素预防感染，抗生素的使用参考《中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南》，推荐从中性粒细胞计数 $<0.1 \times 10^9/L$ 开始使用，至中性粒细胞计数 $>0.5 \times 10^9/L$ 或出现明显的血细胞恢复证据，不推荐对低危患者预防性应用抗生素。



表2 子宫肉瘤系统治疗相关中性粒细胞减少症的分层预防推荐

FN发生风险	药物	预防推荐
低风险 (发生率<10%)	靶向药物	不推荐预防性使用G-CSF
中风险 (发生率10%-20%)	吉西他滨、曲贝替定、艾日布林、吉西他滨+多西他赛	合并任何一条的FN风险因素者，建议预防性使用G-CSF 全部不满足则不建议预防性使用G-CSF
高风险 (发生率>20%)	多柔比星单药、高剂量表柔比星、多柔比星+异环磷酰胺、大剂量异环磷酰胺、氮烯咪胺	建议预防性使用G-CSF

FN定义：口腔温度>38.3℃（腋温>38.1℃）或2h内连续2次测量口腔温度>38.0℃（腋温>37.8℃），并且中性粒细胞绝对值低于或者预计低于0.5X10<sup>9</sup>/L。

预防推荐证据级别：中、低风险 2A类，高风险度 1类



## 2、子宫肉瘤化疗所致血小板减少症（chemotherapy-induced thrombocytopenia, CIT）的防治

（1）CIT的发生机制是化疗药物抑制骨髓巨核细胞，减少血小板生成、增加血小板破坏、引起血小板分布异常。不同化疗药物及方案导致CIT的发生率和严重程度不同，蒽环类是引起CIT的常见化疗药物，尤其是子宫肉瘤常用的联合化疗方案（包含异环磷酰胺、多柔比星、氮烯咪胺）CIT发生率高达79%。

（2）CIT的治疗包括输注血小板和给予促血小板生长因子，输注血小板是快速且有效的方法，降低了重度血小板减少患者大出血的风险和死亡率，但其作用维持时间短，且增加血液传播性疾病的风险，还可能产生血小板抗体造成无效输注或输注后免疫反应。重组人白细胞介素11（recombinant human interleukin 11, rhIL-11）、rhIL-11衍生物（rhIL-11（I））和重组人血小板生成素（recombinant human thrombopoietin, rhTPO）是目前中国国家食品药品监督管理总局（CFDA）批准的用于治疗肿瘤相关血小板减少的药物（表3）。

## 3、子宫肉瘤化疗相关贫血（chemotherapy-related anemia, CRA）的防治

CRA的发病机制尚未明确，研究发现有些化疗药物可阻断红系前体细胞的合成，有些促进红细胞凋亡，或者通过肾脏损伤减少内源性促红细胞生成素。CRA的发生率及程度与化疗药物、方案、肿瘤类型和化疗周期等均有关，且随着化疗周期的重复而逐渐蓄积和加重。CRA的防治主要包括补充铁剂、促红细胞生成治疗和输血治疗。当血红蛋白 $<60\text{g/L}$ ，且出现心动过速、呼吸急促等症状或者心脏病等合并症时，建议红细胞输注，促红细胞生成素和补充铁剂适合所有程度的贫血患者。





子宫肉瘤

治疗副反应及处理原则

表3 子宫肉瘤化疗相关血小板减少症的治疗

是否出血	不同状态血小板减少	治疗推荐
伴有出血	出血量大且与CIT高度相关	. 输注血小板 . 血小板+rhTPO
	出血量不大且与CIT相关性低	处理同不伴出血
不伴出血	血小板计数 $<10\times10^9/L$	. 预防性输注血小板 . 血小板+rhTPO
	$10\times10^9/L<$ 血小板计数 $<75\times10^9/L$	. rhTPO . rhIL-11
	$75\times10^9/L<$ 血小板计数 $<100\times10^9/L$	密切观察血小板及出血情况

治疗推荐：1类



### （三）蒽环类药物心脏毒性的防治

蒽环类药物是子宫肉瘤常用的化疗药，疗效确切，占据重要的治疗地位。但蒽环类药物具有严重而独特的心脏毒性。尤其需要警惕的是蒽环类药物的心脏毒性呈渐进性和不可逆性，特别是初次使用就可能造成心脏损伤，因此，蒽环类药没有绝对的“安全剂量”。患者接受蒽环类药物化疗前需常规进行心脏功能的检测和评估，以兼顾化疗方案的有效性和安全性。

心脏评估的常用方法包括体格检查、生物标志物、心电图和超声心动图检查，而心脏磁共振成像、放射性核素显像和心内膜心肌活检等方法的局限性明显，应用受限。体格检查可以发现心律失常和心衰的体征。生物标志物cTnI， cTnT， BNP和NT-proBNP等是评估和辅助诊断心脏毒性的重要指标，用于心肌损伤的早期识别和预后判断，但是，这些指标的最佳阳性阈值和监测频率尚无定论。

心电图检查可以发现心律失常和QT间期变化，并提供心肌缺血、梗死等信息。超声心动图检查左心室射血分数(Left Ventricular Ejection Fraction, LVEF)是评估左心室功能，监测心脏毒性的最常见工具，如有条件加做左心室总体纵向应变(Global Longitudinal Strain, GLS)检查，GLS是目前早期监测心脏毒性的最敏感指标。当LVEF下降 $\geq 10\%$ 且LVEF $< 50\%$ ，提示出现肿瘤治疗相关心功能不全，即化疗心脏毒性，建议暂停蒽环类药物，同时启动心脏保护治疗。而LVEF下降 $\geq 10\%$ 且LVEF $\geq 50\%$ 和/或GLS下降 $\geq 15\%$ 为亚临床心肌损伤，可在心脏保护治疗的基础上继续蒽环类药物治疗。当LVEF下降 $< 10\%$ 且LVEF $< 50\%$ ，或者基线LVEF $< 40\%$ ，积极进行心脏保护治疗，肿瘤科和心血管内科医生协作，评估是否继续抗肿瘤治疗。当基线 $40\% \leq \text{LVEF} < 50\%$ ，肿瘤科和心血管内科医生协作，进行心脏保护治疗的同时，评估是否调整化疗药物剂量或方案。

蒽环类药物导致心脏毒性的机制尚未明确，研究发现其可以通过产生氧自由基和抑制拓扑异构酶II  $\beta$ 导致DNA双键断裂这两个途径损伤心脏。根据心脏毒性出现的时间，分为急性，慢性和迟发性；临床表现包括心力衰竭、冠状动脉疾病、心动过缓、窦性心动过速、房室传导阻滞、心房颤动、室上性心动过速、室性心动过速/心室颤动、急性心肌炎等。蒽环类药物心脏毒性的防治策略包括限制/降低最大累积剂量（多柔比星 $< 360\text{mg}/\text{m}^2$ ，表柔比星 $< 720\text{mg}/\text{m}^2$ ），采用持续泵注改变传统静脉滴注的给药方式，改变药物剂型（脂质体多柔比星），应用心脏保护药物 $\beta$ 受体阻滞剂、ACEI/ARBs、右雷佐生等。目前只有右雷佐生是经验证有效，且国内外指南广泛推荐用于预防蒽环类药物导致的心脏毒性，每次用蒽环类药物化疗前先用右雷佐生，30分钟内静脉滴注完后立即给与蒽环类药物，推荐剂量比为右雷佐生：多柔比星=20：1，右雷佐生：表柔比星或脂质体多柔比星=10：1。一旦出现了蒽环类药物导致的心脏毒性，肿瘤科医生应该和心内科医生积极协作，力争安全处理相关心脏毒性。





### （四）蒽环类药物外渗的防治

蒽环类药物属于发泡性化疗药，如果渗到血管外间歇，可产生由药物-细胞DNA复合物介导的组织损伤的连续循环，引导更广泛的损伤，造成局部组织红肿、硬结及疼痛，严重者可出现局部皮肤及皮下组织溃疡、坏死，甚至损伤肌腱、神经和血管，导致神经压迫综合征、永久性关节僵硬、挛缩和神经功能障碍。因此，意外渗漏是蒽环类药物的严重并发症，推荐通过中心静脉通路装置（CVAD，包括中心静脉导管CVC、经外周置入中心静脉导管PICC和输液港）而不是外周静脉输注蒽环类药物，以尽量减少药物外渗的风险。

蒽环类药物化疗前需充分评估患者静脉输液外渗的风险因素，包括：1. 静脉小和/或脆弱，或可用的静脉有限；2. 肥胖患者，建立静脉通路的难度大或穿刺导管移位风险高；3. 既往多次化疗或多次静脉穿刺导致静脉硬化；4. 输注时间较长；5. 短时间内大量输注；6. 患者存在认知或是或神经系统缺陷，无法感知给药部位的疼痛或不能对这种疼痛做出反应。合并风险因素的患者使用蒽环类药物，确保通过CVAD输注，但CVAD不能绝对避免意外渗漏，尤其是CVAD长时间留置、CVAD移位、反复穿刺放置等情况下，仍有外渗损伤的病例报道。

#### 1、蒽环类药物外渗的预防措施

预防是避免药物外渗损伤的最佳方法。EONS（European Oncology Nursing Society）制定了化疗药物外渗预防指南。相关的预防措施包括：采用外周静脉通路给药时，要选择大而完好的静脉，首选前臂的贵要静脉、头静脉和前臂正中静脉，发泡性化疗药不应选择肘前窝或手背静脉，要避免硬化、血栓或瘢痕形成的部位、以及有循环障碍的肢体或既往放疗的区域。针头要固定牢靠且易于观察。CVAD置入患者，给药前应确认CVAD位置正确，若注入冲洗液不顺畅、不能回抽血液或患者诉疼痛，应仔细评估导管位置。输注前后，用生理盐水或5%葡萄糖溶液冲洗静脉通路。嘱患者若输注部位出现疼痛、渗漏或其他感觉变化，CVAD患者出现胸痛或呼吸困难，应立刻通知医护。



### 2、蒽环类药物外渗的处理步骤

- (1) 立即停止输液，避免冲管增加外渗部位的压力。
- (2) 将针头留置在原位，尽量回抽外渗液体。
- (3) 抬高患肢，局部冰敷或冷敷，可使血管收缩，减少药物扩散及局部损伤范围，减轻局部炎症和疼痛。
- (4) 伴有中度至重度的疼痛的患者，给予药物镇痛。

(5) 药物解毒，欧洲药物评审组织(EMA)和美国FDA都已批准右雷佐生用于治疗蒽环类药物外渗所致损伤。应在外渗后6h内尽快静脉注射右雷佐生解毒，选非外渗侧的肢体静脉通路输注右雷佐生3次，前2次剂量均为 $1000\text{mg}/\text{m}^2$ ，第3次剂量为 $500\text{mg}/\text{m}^2$ ，首次在外渗后6h内输注，随后在外渗后24h和48h分别输注，每次输注持续1~2h，3次的最大剂量分别不超过2000mg、2000mg和1000mg。如外周静脉通路外渗后不能立即使用右雷佐生，则用二甲亚砜（99%）涂抹于渗漏区的皮肤，4~8h重复一次，连续7~14d。目前尚无证据表明右雷佐生联合二甲亚砜会有额外获益，因此不推荐两者同时使用。

(6) 外科干预，当外渗部位出现组织坏死或溃疡时，需要清创、植皮或皮瓣移植，外科干预的最佳时机仍有争议。尽管保守治疗能解决程度较轻的外渗而避免外科干预，但欧洲肿瘤护理协会（European Oncology Nursing Society, EONS）指南推荐尽快请外科会诊，酌情切除受损组织或者皮下积液外科引流。一些医生建议尽早进行外科干预，防治发生溃疡，减少后续复杂的外科手术需求。但最终导致溃疡的发疱剂外渗事件占比不到1/3，因此通常推荐保守治疗。手术指针包括：保守治疗失败，患者的红斑、

肿胀和疼痛持续，存在大面积组织坏死或溃疡。目前有关CVAD外渗外科干预的研究很少，只有病例报道。纵隔的浆膜层可能很好的防御了外渗导致的损伤，因此发生在纵隔的外渗，可采取抗生素、镇痛药和胸膜腔引流的保守治疗。



### （五）免疫治疗的副反应及处理

子宫肉瘤免疫检查点抑制剂（immune checkpoint inhibitor, ICI）治疗的相关毒性及处理：皮肤不良事件、胃肠毒性、肝脏毒性、关节痛和肌肉痛是ICI的常见不良反应，发生率取决于ICI的种类、剂量及是否联合使用，其中胃肠毒性是ICI治疗中断的常见原因。ICI治疗相关的内分泌毒性、胰腺炎、肺炎、神经毒性、血液毒性、肾脏毒性、心脏毒性和眼毒性等较少发生。多数ICI相关的毒性可以通过糖皮质激素治疗而改善，且不影响ICI的继续使用。如果发生严重或危及生命的毒性反应，则应永久停止使用ICI。如果出现ICIs输注反应，症状轻微或中等时，减慢输液速度或暂停输注对症处理，严重的输注反应，参照各种输注反应指南迅速处理。

### （六）靶向治疗的副反应及处理

子宫肉瘤的靶向治疗主要包括抗血管生成小分子酪氨酸激酶抑制剂（tyrosine kinase inhibitors, TKI）和PARP抑制剂。

TKI的常见不良反应为高血压、蛋白尿、手足综合征、肝脏毒性、胃肠道反应、口腔炎、黏膜炎、疲劳乏力等，不同TKI药物和不同联合给药方式，不良反应的发生率也不同，在TKI治疗过程中需严密监测患者的出血相关症状和体征以及血小板、凝血酶原时间等实验室检查结果，有出血风险及凝血功能异常的患者应慎用TKI。如果出现严重（3~4级）不良反应，应暂停使用TKI治疗，对症处理，不良反应缓解后，可继续或减量使用。

PARP抑制剂不良反应具有剂量相关性，常见副反应包括血液学毒性、胃肠道毒性及疲劳，多出现在开始服药的前3个月。重度或危及生命的不良反应中，大部分是血液毒性，这也是导致减量、中断或停止用药的最常见原因。绝大多数神经系统毒性、胃肠道毒性和心血管毒性通过对症治疗缓解，无需减量或停药，其他少见毒性包括呼吸道毒性，背痛和关节痛、色素沉着等。不良反应多表现为轻度或中度，可通过减量、暂停药物及对症治疗缓解。



中华医学会妇科肿瘤学分会推荐等级及其意义

推荐级别	代表意义
1类	基于高级别临床研究证据，专家意见高度一致
2A类	基于低级别临床研究证据，专家意见高度一致；或基于高级别临床研究证据，专家意见基本一致
2B类	基于低级别临床研究证据，专家意见基本一致；或基于高级别证据，专家意见存在争议
3类	不论基于何种级别临床研究证据，专家意见明显分歧

**讨论：将于2023年12月31日前发布**

- （一）概述
- （二）病理特征
- （三）评估及分期
- （四）保留生育功能
- （五）辅助治疗
- （六）晚期复发患者治疗



1. Hensley ML, Barrette BA, Baumann K, et al. Gynecologic Cancer InterGroup (GCIG) consensus review: uterine and ovarian leiomyosarcomas[J]. Int J Gynecol Cancer. 2014;24(9 Suppl 3):S61-6. PMID: 25341583.
2. Costales AB, Radeva M, Ricci S. Characterizing the efficacy and trends of adjuvant therapy versus observation in women with early stage (uterine confined) leiomyosarcoma: a National Cancer Database study[J]. J Gynecol Oncol. 2020;31(3):e21. PMID: 32266798.
3. Reed NS, Mangioni C, Malmström H, et al. Phase III randomised study to evaluate the role of adjuvant pelvic radiotherapy in the treatment of uterine sarcomas stages I and II: an European Organisation for Research and Treatment of Cancer Gynaecological Cancer Group Study (protocol 55874) [J]. Eur J Cancer. 2008;44(6):808-18. PMID: 18378136.
4. Reichardt P. The treatment of uterine sarcomas[J]. Ann Oncol. 2012;23 Suppl 10:x151-7. PMID: 22987952.
5. Rizzo A, Nannini M, Astolfi A, et al. Impact of Chemotherapy in the Adjuvant Setting of Early Stage Uterine Leiomyosarcoma: A Systematic Review and Updated Meta-Analysis[J]. Cancers (Basel). 2020;12(7):1899. PMID: 32674439.
6. Hensley ML, Enserro D, Hatcher H, et al. Adjuvant Gemcitabine Plus Docetaxel Followed by Doxorubicin Versus Observation for High-Grade Uterine Leiomyosarcoma: A Phase III NRG Oncology/Gynecologic Oncology Group Study[J]. J Clin Oncol. 2018;36(33):JCO1800454. PMID: 30289732.
7. Desar IME, Ottevanger PB, Benson C, et al. Systemic treatment in adult uterine sarcomas[J]. Crit Rev Oncol Hematol. 2018;122:10-20. PMID: 29458779.
8. Maccaroni E, Lunerti V, Agostinelli V, et al. New Insights into Hormonal Therapies in Uterine Sarcomas. Cancers (Basel). 2022 12;14(4):921. PMID: 35205669.
9. Nathenson MJ, Ravi V, Fleming N, et al. Uterine Adenosarcoma: a Review[J]. Curr Oncol Rep. 2016;18(11):68. PMID: 27718181.
10. Friedlander ML, Covens A, Glasspool RM, et al. Gynecologic Cancer InterGroup (GCIG) consensus review for mullerian adenosarcoma of the female genital tract[J]. Int J Gynecol Cancer. 2014;24(9 Suppl 3):S78-82. PMID: 25341585.
11. Haldorsen IS, Salvesen HB. What is the best preoperative imaging for endometrial cancer? [J]. Curr Oncol Rep 2016;18:25.
12. Vargas HA, Akin O, Zheng J, et al. The value of MR imaging when the site of uterine cancer origin is uncertain[J]. Radiology 2011;258:785-792.
13. Sohaib SA, Houghton SL, Meroni R, et al. Recurrent endometrial cancer: patterns of recurrent disease and assessment of prognosis[J]. Clin Radiol 2007;62:28-34; discussion 35-36.
14. Lakhman Y, Katz SS, Goldman DA, et al. Diagnostic performance of computed tomography for preoperative staging of patients with non-endometrioid carcinomas of the uterine corpus[J]. Ann Surg Oncol 2016;23:1271-1278.





- 15 .Colombo N, Creutzberg C, Amant F, et al.ESMO-ESGO-ESTRO Endometrial Consensus Conference Working Group. ESMO-ESGO-ESTRO Consensus Conference on Endometrial Cancer: diagnosis, treatment and follow-up[J].Ann Oncol 2016;27:16-41.
- 16 .Sala E, Rockall AG, Freeman SJ, et al. The added role of MR imaging in treatment stratification of patients with gynecologic malignancies: what the radiologist needs to know[J].Radiology 2013;266:717-740.
- 17 .赵阳.子宫腺肉瘤的MRI影像特征分析[J].南昌大学学报：医学版,2021,61(1):52-56
- 18 .山东省临床肿瘤学会妇科肿瘤专业委员会,中国医师协会微无创医学专业委员会妇科肿瘤学组. 低级别子宫内膜间质肉瘤诊治的专家共识(2022年版)[J]. 中华肿瘤防治杂志,2022,29(18):1305-1313,1329. DOI:10.16073/j.cnki.cjcp.2022.18.01.
- 19 .张璐芳,蔡晶,黄邦杏,等. 术前如何鉴别诊断子宫肉瘤与子宫肌瘤[J]. 中国实用妇科与产科杂志,2019,35(8):861-864. DOI:10.19538/j.fk2019080104.
- 20.于澜,王刚,李志明,等. 子宫内膜间质肉瘤的CT及MRI影像学表现[J]. 临床放射学杂志,2020,39(4):715-719.
21. Ghirardi V, Bizzarri N, Guida F, et al. Role of surgery in gynaecological sarcomas[J].Oncotarget. 2019;10(26):2561-2575. PMID: 31069017.
22. Shushkevich A, Thaker PH, Littell RD, et al. State of the science: Uterine sarcomas[J].From pathology to practice[J].Gynecol Oncol. 2020;159(1):3-7. PMID: 32839026.
23. L'Heveder A, Jones BP, Saso S, et al. Conservative management of uterine adenosarcoma: lessons learned from 20 years of follow-up[J].Arch Gynecol Obstet. 2019;300(5):1383-1389. PMID: 31584132.
24. Ricciardi E, Plett H, Sangiorgio V, et al. Adult primary cervical rhabdomyosarcomas: A Multicentric cross-national case series[J].Int J Gynecol Cancer. 2020;30(1):21-28. PMID: 31780571.
25. Kostov S, Kornovski Y, Ivanova V, et al. New Aspects of Sarcomas of Uterine Corpus-A Brief Narrative Review[J].Clin Pract. 2021;11(4):878-900. PMID: 34842646.
26. Friedlander ML, Covens A, Glasspool RM, et al. Gynecologic Cancer InterGroup (GCIG) consensus review for mullerian adenosarcoma of the female genital tract[J]. Int J Gynecol Cancer. 2014;24(9 Suppl 3):S78-82. PMID: 25341585.
27. 中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会. 子宫肉瘤诊断与治疗指南（2021年版） [J] . 中国癌症杂志, 2021, 31 (6): 513-519.
- 28.Muss HB, Bundy B, DiSaia PJ, et al.Treatment of recurrent or advanced uterine sarcoma. A randomized trial of doxorubicin versus doxorubicin and cyclophosphamide (a phase III trial of the Gynecologic Oncology Group) [J].Cancer ,1985, 55(8):1648-1653.



- 29.Thigpen JT, Blessing JA, DiSaia PJ, et al.A randomized comparison of doxorubicin alone versus doxorubicin plus cyclophosphamide in the management of advanced or recurrent endometrial carcinoma: A Gynecologic Oncology Group study[J].J Clin Oncol 1994, 12(7):1408-1414.
- 30.Mouridsen HT, Bastholt L, Somers R, et al.Adriamycin versus epirubicin in advanced soft tissue sarcomas. A randomized phase II/phase III study of the EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma Group[J]. Eur J Cancer Clin Oncol 1987, 23(10):1477-1483.
- 31.Kushner DM, Webster KD, Belinson JL, et al.Safety and efficacy of adjuvant single-agent ifosfamide in uterine sarcoma[J].Gynecol Oncol 2000, 78(2):221-227.
- 32.Benson C, Ray-Coquard I, Sleijfer S, et al.Outcome of uterine sarcoma patients treated with pazopanib: A retrospective analysis based on two European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Soft Tissue and Bone Sarcoma Group (STBSG) clinical trials 62043 and 62072[J].Gynecol Oncol 2016, 142(1):89-94.
- 33.Anderson S, Aghajanian C.Temozolomide in uterine leiomyosarcomas[J].Gynecologic oncology 2005, 98(1):99-103.
- 34.Schoffski P, Chawla S, Maki RG, et al..Eribulin versus dacarbazine in previously treated patients with advanced liposarcoma or leiomyosarcoma: a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial[J]. Lancet,2016, 387(10028):1629-1637.
- 35.Demetri GD, Chawla SP, von Mehren M, et al.Efficacy and safety of trabectedin in patients with advanced or metastatic liposarcoma or leiomyosarcoma after failure of prior anthracyclines and ifosfamide: results of a randomized phase II study of two different schedules[J].J Clin Oncol,2009, 27(25):4188-4196.
- 36.Look KY, Sandler A, Blessing JA, et al.Phase II trial of gemcitabine as second-line chemotherapy of uterine leiomyosarcoma: a Gynecologic Oncology Group (GOG) Study[J].Gynecol Oncol,2004, 92(2):644-647.
- 37.Hensley ML, Blessing JA, Degeest K, et al.Fixed-dose rate gemcitabine plus docetaxel as second-line therapy for metastatic uterine leiomyosarcoma: a Gynecologic Oncology Group phase II study[J]. Gynecol Oncol,2008, 109(3):323-328.
- 38.Judson I, Verweij J, Gelderblom H, et al.Doxorubicin alone versus intensified doxorubicin plus ifosfamide for first-line treatment of advanced or metastatic soft-tissue sarcoma: a randomised controlled phase 3 trial [J].Lancet Oncol,2014, 15(4):415-423.
- 40.Garcia-Del-Muro X, Lopez-Pousa A, Maurel J, et al.Randomized phase II study comparing gemcitabine plus dacarbazine versus dacarbazine alone in patients with previously treated soft tissue sarcoma: a Spanish Group for Research on Sarcomas study[J]. J Clin Oncol,2011, 29(18):2528-2533.
- 41.Friedlander M, Benson C, O'Connell RL, et al.Phase 2 study of anastrozole in patients with estrogen receptor/progesterone receptor positive recurrent low-grade endometrial stromal sarcomas: The PARAGON trial (ANZGOG 0903) [J].Gynecol Oncol,2021, 161(1):160-165.





42. George S, Feng Y, Manola J, Nucci MR, et al. Phase 2 trial of aromatase inhibition with letrozole in patients with uterine leiomyosarcomas expressing estrogen and/or progesterone receptors[J]. Cancer 2014, 120(5):738-743.
43. Chu MC, Mor G, Lim C, et al. Low-grade endometrial stromal sarcoma: hormonal aspects[J]. Gynecol Oncol 2003, 90(1):170-176.
16. Wagner AJ, Ravi V, Riedel RF, et al. nab-Sirolimus for Patients With Malignant Perivascular Epithelioid Cell Tumors[J]. J Clin Oncol 2021, 39(33):3660-3670.
44. Damirov F, Menge F, Hohenberger P. Retroperitoneal Perivascular Epithelioid Cell Neoplasm (Pecoma) Response To Mtor Kinase Inhibition. A Case Report with Literature Review[J]. Georgian Med News 2022(332):56-59.
45. Mosse YP, Voss SD, Lim MS, et al. Targeting ALK With Crizotinib in Pediatric Anaplastic Large Cell Lymphoma and Inflammatory Myofibroblastic Tumor: A Children's Oncology Group Study[J]. J Clin Oncol 2017, 35(28):3215-3221.
46. Palmeri M, Mehnert J, Silk AW, et al. Real-world application of tumor mutational burden-high (TMB-high) and microsatellite instability (MSI) confirms their utility as immunotherapy biomarkers[J]. ESMO Open 2022, 7(1):100336.
47. Marcus L, Fashoyin-Aje LA, Donoghue M, et al. FDA Approval Summary: Pembrolizumab for the Treatment of Tumor Mutational Burden-High Solid Tumors[J]. Clin Cancer Res 2021, 27(17):4685-4689.
48. Carlson JJ, Italiano A, Brose MS, et al. Comparative effectiveness of larotrectinib and entrectinib for TRK fusion cancer[J]. Am J Manag Care 2022, 28(2 Suppl):S26-S32.
49. Pan M, Ganjoo K, Karam A: Rapid Response of a BRCA2/TP53/PTEN-Deleted Metastatic Uterine Leiomyosarcoma to Olaparib: A Case Report. Perm J 2021, 25.
50. Hensley ML, Chavan SS, Solit DB, et al. Genomic Landscape of Uterine Sarcomas Defined Through Prospective Clinical Sequencing. Clin Cancer Res 2020, 26(14):3881-3888.
51. KLOPP A, SMITH BD, ALEKTIAR K, et al. The role of postoperative radiation therapy for endometrial cancer: executive summary of an American Society for Radiation Oncology evidence-based guideline [J]. Pract Radiat Oncol, 2014, 4(3): 137-144.
52. Roberts ME, Aynardi JT, Chu CS. Uterine leiomyosarcoma: A review of the literature and update on management options [J]. Gynecol Oncol, 2018, 151 (3) : 562-572
53. 陶胜男, 周颖, 孙金, 等. 子宫肉瘤研究进展[J]. 国际妇产科学杂志, 2019, 46 (3) : 249-252.
54. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Uterine Neoplasms, V.1.2022. [EB/OL]. <http://www.nccn.org/>.



55. Meyer LA, Bohlke K, Powell MA, et al. Postoperative Radiation Therapy for Endometrial Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Endorsement of the American Society for Radiation Oncology Evidence-Based Guideline[J]. J Clin Oncol, 2015;33:2908-2913.
56. Coon D, Beriwal S, Heron DE, et al. High-dose-rate Rotte "Y" applicator brachytherapy for definitive treatment of medically inoperable endometrial cancer: 10-year results[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 71:779-783.
57. de Boer SM, Powell ME, Mileskin L, et al. Toxicity and quality of life after adjuvant chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for women with high-risk endometrial cancer (PORTEC-3): an open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial [J]. Lancet Oncol 2016; 17:1114-1126.
58. Razvi Y, Chan S, McFarlane T, et al. ASCO, NCCN, MASCC/ESMO: a comparison of antiemetic guidelines for the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in adult patients[J]. Support Care Cancer 2019; 27(1):87-95.
59. 张玉. 化疗所致恶心呕吐的药物防治指南[J]. 中国医院药学杂志. 2022; 42(05):457-473.
60. 秦叔逵, 马军. 中国临床肿瘤学会（CSCO）肿瘤放化疗相关中性粒细胞减少症规范化管理指南（2021）[J]. 临床肿瘤学杂志. 2021; 26(07):638-648.
61. 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 软组织肉瘤诊疗指南. 人民卫生出版社; 2022.
62. Becker PS, Griffiths EA, Alwan LM, et al. NCCN Guidelines Insights: Hematopoietic Growth Factors, Version 1.2020[J]. J Natl Compr Canc Netw 2020; 18(1):12-22.
63. 史艳侠, 邢锴元, 张俊, 沈波. 中国肿瘤化疗相关性血小板减少症专家诊疗共识（2019版）[J]. 中国肿瘤临床. 2019; 46(18):923-929.
64. 史艳侠, 邢锴元, 张俊, 沈波. 中国肿瘤化疗相关贫血诊治专家共识（2019年版）[J]. 中国肿瘤临床. 2019; 46(17):869-875.
65. 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 蒽环类药物心脏毒性指南. 人民卫生出版社; 2020.
66. Pudil R, Mueller C, Celutkienė J, et al. Role of serum biomarkers in cancer patients receiving cardiotoxic cancer therapies: a position statement from the Cardio-Oncology Study Group of the Heart Failure Association and the Cardio-Oncology Council of the European Society of Cardiology[J]. Eur J Heart Fail 2020; 22(11):1966-1983.
67. Armenian SH, Lacchetti C, Barac A, et al. Prevention and Monitoring of Cardiac Dysfunction in Survivors of Adult Cancers: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline[J]. J Clin Oncol 2017; 35(8):893-911.
68. Razvi Y, Chan S, McFarlane T, et al. ASCO, NCCN, MASCC/ESMO: a comparison of antiemetic guidelines for the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in adult patients[J]. Support Care Cancer 2019; 27(1):87-95.



69. 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 肿瘤治疗相关心血管毒性防治指南. 人民卫生出版社 2021.
70. Curigliano G, Lenihan D, Fradley M, et al. Management of cardiac disease in cancer patients throughout oncological treatment: ESMO consensus recommendations[J].Ann Oncol 2020; 31(2):171-190.
71. Zamorano JL, Lancellotti P, Rodriguez Munoz D, et al. 2016 ESC Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines: The Task Force for cancer treatments and cardiovascular toxicity of the European Society of Cardiology (ESC) [J].Eur Heart J 2016; 37(36):2768-2801.
72. Susser WS, Whitaker-Worth DL, Grant-Kels JM. Mucocutaneous reactions to chemotherapy[J].J Am Acad Dermatol 1999; 40(3):367-398; quiz 399-400.
73. Perez Fidalgo JA, Garcia Fabregat L, Cervantes A, et al. Management of chemotherapy extravasation: ESMO-EONS Clinical Practice Guidelines[J].Ann Oncol 2012; 23 Suppl 7:vii167-173.
74. Mouridsen HT, Langer SW, Buter J, et al. Treatment of anthracycline extravasation with Savene (dexrazoxane): results from two prospective clinical multicentre studies[J].Ann Oncol 2007; 18(3):546-550.
75. Perez-Fidalgo JA, Cervantes A. Reply to 'Comment on: management of chemotherapy extravasation: ESMO-EONS clinical practice guidelines[J]. Ann Oncol 2013; 24(4):1129-1130.
- 76.中华医学会妇科肿瘤学分会. 妇科肿瘤免疫检查点抑制剂临床应用指南（2023版）[J/CD]. 肿瘤综合治疗电子杂志, 2023, 9（2）：67-98.
77. 中国临床肿瘤协会(CSCO)妇科肿瘤专家委员会. 抗血管生成小分子酪氨酸激酶抑制剂在复发转移或晚期妇科肿瘤临床应用的中国专家共识(2022版). 中国癌症防治杂志 2023; 15(1):1-10.
- 78.中华医学会妇科肿瘤学分会. 卵巢癌PARP抑制剂临床应用指南（2023版）[J/CD]. 肿瘤综合治疗电子杂志, 2022, 8(3):14.



# 中国妇科肿瘤临床实践指南第7版（2023）

## 子宫肉瘤

### 意见反馈

本指南目前为讨论稿，不当之处敬请妇科肿瘤专业同道提出反馈意见，年底前统一修正。

反馈意见发送至：[xdfckjz@sina.com](mailto:xdfckjz@sina.com)